

Täublinge (*Russula*) und Milchlinge (*Lactarius*)

zwei Pilzgattungen der Ordnung Sprödblätterartige
(*Russulales*)

Täublinge:

- kleine bis große Pilze
- brüchiges nicht faseriges Fleisch, Stiel auch watteartig
- zylindrische Stiel, ohne Knolle
- ohne Ring (Manschette)
- Stiel mit anderen Farben überhaucht
- vielfarbige Hüte, Mischfarben
- Sporenpulver weiß, cremefarben, ockergelb, dottergelb
- Mykorrhizabildner mit vielen Baumarten
- Vorkommen nur im Wald
- ca. 150 Arten in Mitteleuropa




Milchlinge
zusätzliche
Merkmale

Milchlinge:

- Lamellen und Stiele sondern bei Verletzung Milchsaft ab
- Lamellen oft am Stiel herablaufend
- Stiele fast gleichfarbig wie Hut
- Hüte weniger farbenfroh, dafür mit konzentrischen Ringzonen
- Hut auch schuppig und mit Fransen über dem Rand hängend
- Sporenpulver weiß bis ockerfarben, nicht dottergelb
- ca. 85 Arten in Mitteleuropa

Täublings- Milchlingsregel → **Kostprobe: alle mild schmeckenden Arten sind essbar**




brüschig

faserig

Stiel:
gekammert

hohl oder



Lamellen:

- 3. gleichlang
- 4. verschiedenlang
- 5. gegabelt
- 6. zweispaltig oder mit Querverbindung
- 7. untermischt

Lamellen splintern/ spritzen beim Darüberfahren ab!

1 Ausnahme! Frauentäubling